СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ КАРБОНАТНОМУ ҐРУНТІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автори: ***М.М. Городній, В.М. Макаренко, Л.І. Мазуркевич, В.Ф. Балабайко***

Наукова основа системи застосування добрив у сівозміні повинна бути складовою частиною системи ведення сільського господарства.

У зерно-буряковій сівозміні на лучно-чорноземних карбонатних ґрунтах Лісостепу України (середня забезпеченість елементами живлення) для одержання стабільного врожаю інтенсивних сортів зерна озимої пшениці, що вирощують після багаторічних трав (65-70 ц/га), гороху (55-60 ц/га), з вмістом білка 13-14 % та клейковини 27-29 %, необхідно на фоні високого рівня агротехніки та захисту рослин, що проводиться з урахуванням фітосанітарного стану посівів, вносити: після багаторічних трав N_{30} P_{80} K_{80} + N_{30}; весною у підживлення за методом Бузницького (дисковими сівалками), а після гороху — 20 т/га + N_50 P_80 K_80 + N_30.



Рис. Частка різних факторів у формуванні врожаю зернових культур

Пропонується система удобрення пшениці озимої сорту Миронівська-61 на лучно-чорноземних ґрунтах.

Додаткову інформацію можна отримати:
Науково-дослідний інститут агротехнологій та якості продукції рослинництва
Національного аграрного університету,
Кафедра агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна

E-mail: agrotech_reserch@twin.nauu.kiev.ua
Тел.: (044) 527-87-83
527-88-17
527-80-93