

Щоб не зашкодити собі, потрібно твердо знати, коли краще приймати ліки

Продовжуємо публікацію щодо схем застосування найбільш поширених лікарських засобів.

№ п/п	Назва препарату	Призначення	Час застосування
1	Мукалтин	Відхаркуюче	За 5-10 хв до прийому їжі
2	Мікстура Павлова, мікстура Кватера	Заспокійливе	За 30-40 хв до прийому їжі
3	Метацин (метилурацил)	Загальнозміцнююче	Під час, або після прийому їжі
4	Ноотропіл (пірацетам, пірамам)	Для покращення мозкового кровообігу	За 5-15 хв до прийому їжі
5	Нітроксолін (5-нок)	За захворювань нирок	Під час прийому їжі
6	Но-шпа	Спазмолітик	Після прийому їжі
7	Калію оротат	Для профілактики дефіциту калію	Натще
8	Панангін	За захворювань серця	Через 10-20 хв після прийому їжі
9	Панкреатин	За захворювань підшлункової залози	Безпосередньо перед прийомом їжі, запиваючи лужною водою
10	Папаверин	Спазмолітик	Натще
11	Парацетамол (аналог - панадол)	Жарознижуюче та болетамувальне	Після прийому їжі
12	Панзинорм	За захворювань підшлункової залози	Через 10-20 хв після прийому їжі
13	Папазол	Гіпотензивне (для зниження тиску)	Натще
14	Преднізолон	Гормональний засіб	Під час або зразу ж після прийому їжі
15	Препарати подорожника	За зниженої кислотності шлункового соку	За 20-30 хв до прийому їжі
16	Рибоксин	Серцевий засіб	За 5-15 хв до прийому їжі
17	Раунатин	Гіпотензивне (для	Через 10-20 хв після

		зниження тиску)	прийому їжі
18	Респірин	Протизапальний засіб	Під час, або ж зразу після прийому їжі
19	Сенадексин	Послаблюючий (проносний) засіб	Перед прийомом їжі на ніч
20	Сустак	Серцевий засіб	За 5-15 хв до прийому їжі
21	Триампур	Сечогінний засіб	Через 10-20 хв після прийому їжі
22	Троксевазин	За захворювань судин кінцівок	Під час, або ж зразу після прийому їжі
23	Трирезид	Гіпотензивне (для зниження тиску)	Через 10-20 хв після прийому їжі
24	Уролесан	За захворювань нирок та сечовидільних шляхів	До прийому їжі на сахарозі
25	Фуразолідон, фурадонін	За захворювань нирок	Через 10-20 хв після прийому їжі
26	Фуросемід	Сечогінне	Під час, або ж зразу після прийому їжі
27	Холензим	За захворювань печінки	Через 10-20 хв після прийому їжі
28	Цинаризин	Для покращення мозкового кровообігу	Під час прийому їжі
29	Церукал	Протиблювальний засіб	За 5-15 хв до прийому їжі
30	Ефедрин	Для усунення спазмів бронхів	За 5-15 хв до прийому їжі
31	Есенціале	За захворювань печінки	Перед, або під час прийому їжі
32	Еуфілін	Для зняття спазмів бронхів	Через 10-20 хв після прийому їжі
33	Елеутерокок	Для підвищення тиску за гіпотонії	За 30 хв до прийому їжі

*Зав. кафедри фармакології та токсикології,
професор В.Б. Духницький*