

Прогулянка територією Боярського лісівництва.

Нарешті ми зібралися і вирушили до осіннього лісу. І хоч в Києві було досить вітряно і прохолодно, ліс нас зустрів привітно і затишно. Побачили багато цікавих речей, на які у повсягденні не звертали уваги. Засмутила велика кількість побутового сміття, що залишається і, навіть, свідомо завозиться людьми. Варто цінувати землю, на якій живеш, вчишся, працюєш, з повагою ставитися до довкілля.




У лісових екосистемах великим видовим різноманіттям відрізняються дереворуйнівні, або їх ще називають ксилотрофні гриби. Серед них Миронюк Михайло знайшов гливу звичайну, або плеврот черепчастий *Pleurotus ostreatus* з родини глибові відділу базидіомікоти, що зростає на мертвій деревині та на ослаблених рослинах.

Роль чаги у фітоценозах мішаних лісів неоднозначна. З одного боку як збудник стовбурових гнилей гриб негативно впливає на фітосанітарний стан лісу. З іншого боку, гриб є малопоширеним, вражає незначну кількість дерев, розмножується і поширюється досить повільно. Та, не зважаючи на свою паразитичну сутність, чага є корисною для людини і використовується з глибокої давнини людьми для лікування різних недуг.



Упродовж екскурсії Боярським лісівництвом Прокопчук Віталій зацікавився міцною і довговічною рослиною з дрібними яблуками, які можна вживати в їжу – глодом колючим

Crataegus laevigata. При цьому рослини невибагливі до ґрунту, дають їжу птахам , дрібним тваринкам. Отак промайнув наш осінній день, який надихнув нас на нові відкриття і жагу до знань.



Студент агробіологічного факультету Ярошук Максим